

GUÍA FLORAL PARA LA CIUDAD DE MENDOZA Y SUS ALREDEDORES

Floral guide for Mendoza city and its surroundings

ENRIQUE PALADINI

M. Moreno 570, 5501 G. Cruz

La presente nota tiene por objetivo brindar información local sobre los requerimientos de cultivo de diferentes especies subarborescentes, comúnmente empleadas en jardinería, en la ciudad de Mendoza.

En el cuadro sinóptico adjunto se emplean los siguientes términos:

Plantas anuales: especies herbáceas cuyo ciclo siembra-floración dura como máximo 12 meses.

Forma de siembra

Almácigo: se requiere ésta siembra con semillas muy pequeñas, o de aquellas que dan origen a plantas muy delicadas en su primera etapa de crecimiento requiriendo asiduos cuidados durante esta parte del ciclo vegetativo. Cuando los ejemplares han adquirido mayor tamaño y resistencia se transplantan o repican a maceta o lugar definitivo donde llegarán a florecer.

Asiento: se denomina de esta manera cuando la planta cumple su ciclo en el mismo lugar donde se sembró; por lo general se emplea este tipo de siembra en plantas de raíz pivotante (*Eschscholzia californica*), o algunas especies de semillas grandes (*Zinnia elegans*).

Exposición

A pleno sol: son aquellas plantas que indefectiblemente debe estar expuestas al sol, de no ser así puede que crezcan sin llegar a florecer (*Tagetes spp.*).

Sol: son plantas que requieren al menos una exposición diaria al sol de 8 horas.

Media sombra: especies que requieren ser cultivadas al resguardo del sol (en media sombra de esteros, árboles, etc.).

Destino

Macizo: conjunto de gran número de ejemplares de la misma especie, de igual altura y, preferentemente, del mismo color de follaje y flores.

Bordura o borde floral: constituido por diversas especies, de distintas alturas y fechas de floración. Admite composiciones simples y complejas.

Flor cortada: se denomina así a aquellas especies cuyas flores que por sus largos pedúnculos, resistencia a la marchitez, al transporte, etc. se prestan para ser colocadas en floreros.

Nombre científico	Familia	Nombre común	Nº aprox. de semillas/g	Epoca de siembra												Forma de siembra
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<i>Ageratum houstonianum</i>	Compuestas	Agerato celestino	7,000									o	x	x	x	almácigo
<i>Antirrhinum majus</i>	Escrofulariáceas	Conejito	6,000	x	x	x										almácigo
<i>Amaranthus caudatus</i>	Amarantáceas	Moco de pavo-Bledo	1,200									x	x	x	x	almác./asien.
<i>Amaranthus tricolor</i>	Amarantáceas	Ala de loro	1,200									x	x	x		asiento
<i>Arcototis grandis</i>	Compuestas	Arctotis	640	x	x	x										almácigo
<i>Calendula officinalis</i>	Compuestas	Caléndula-chinita-virreina	140	x	x	x										almácigo
<i>Callistephus sinensis</i>	Compuestas	Margarita de Asti	450									o	x	x	x	almácigo
<i>Celosia cristata</i>	Amarantáceas	Cresta de gallo	1,200									x	x	x		almácigo
<i>Centaurea cyanus</i>	Compuestas	Centáurea	220	x	x	x										almácigo
<i>Clarkia elegans</i>	Enoteráceas	Clarkia	3,500									x	x	x		almácigo
<i>Cleome spinosa</i>	Caparidáceas	Cleome	700									x	x	x		asiento
<i>Coreopsis tinctoria</i>	Compuestas	Coreopsis	400									x	x	x	x	almácigo
<i>Cosmos bipinnatus</i>	Compuestas	Cosmos	200									x	x	x		almácigo
<i>Cheiranthus cheiri</i>	Crucíferas	Alelí amarillo	450	x	x	x	x									almácigo
<i>Dianthus barbatus</i>	Cariofiláceas	Ramillete	950									x	x	x		almácigo
<i>Dianthus sinensis</i>	Cariofiláceas	Clavelina	950	x	x	x	x									almácigo
<i>Dimorphoteca aurantica</i>	Compuestas	Dimorphoteca	700	x	x	x	x									asiento
<i>Eschscholzia californica</i>	Papaveráceas	Amapolilla de California	600	x	x	x	x					x	x	x		asiento
<i>Euphorbia marginata</i>	Euforbiáceas	Euphorbia	90									x	x	x		almácigo
<i>Gaillardia pulchella</i>	Compuestas	Gaillardia	500	x	x							x	x	x		almácigo
<i>Godetia amoena</i>	Enoteráceas	Godetia	1,500	x	x	x	x									almácigo
<i>Gomphrena globosa</i>	Amarantáceas	Gomphena	200									x	x	x		almácigo
<i>Gypsophila elegans</i>	Cariofiláceas	Flor de ilusión	400	x	x	x	x									asiento
<i>Helichrysum bracteatum</i>	Compuestas	Siempreviva	1,250	x	x	x	x									almácigo
<i>Iberis umbellata</i>	Crucíferas	Iberis-carraspique	420	x	x	x	x									almácigo
<i>Impatiens balsamina</i>	Balsamináceas	Brinco	120									o	x	x	x	almác./asien.
<i>Lathyrus odoratus</i>	Leguminosas	Arvejilla de olor	12				x	x	x							asiento
<i>Limonium sinuatum</i>	Plumbagináceas	Statice	15	x	x	x						x	x	x		almácigo
<i>Linaria maroccana</i>	Escrofulariáceas	Linaria-Picardía	4,600	x	x	x										asiento
<i>Linum grandiflorum</i>	Lináceas	Lino rojo	270				x	x	x							asiento
<i>Malcomia maritima</i>	Crucíferas	Alelí de Mahom-papel pic.	2,800	x	x	x	x									asiento
<i>Mathiola incana</i>	Crucíferas	Alelí	640	x	x	x	x									almácigo
<i>Papaver nudicaule</i>	Papaveráceas	Amapolilla de Islandia	8,000	x	x	x	x									almácigo
<i>Petunia hybrida</i>	Solanáceas	Petunia	12,000	x	x	x	x					o	x	x	x	almácigo
<i>Penstemon hartwegii</i>	Escrofulariáceas	Penstemon	1,750	x	x	x										almácigo
<i>Phlox drummondii</i>	Polemoniáceas	Phlox anual	600				x	x								almácigo
<i>Portulaca grandiflora</i>	Portulacáceas	Portulaca-Flor de seda	11,000									x	x	x	x	almácigo
<i>Rudbeckia bicolor</i>	Compuestas	Rudbeckia	2,000	x	x							x	x	x		almácigo
<i>Salvia splendens</i>	Labiadas	Coral	300									o	x	x	x	almácigo
<i>Tagete sp.</i>																
<i>(T. patula-T. erecta)</i>	Compuestas	Copetes-Clavel amarillo	280									x	x	x	x	almácigo
<i>Tithonia rotundifolia</i>	Compuestas	Mirasolmejicano	100									x	x	x		asiento
<i>Tropaeolum majus</i>	Tropeoláceas	Capuchina-Taco de reina	8									x	x	x		asiento
<i>Venidium fastuosum</i>	Compuestas	Venidium	2,500	x	x	x										almácigo
<i>Viola tricolor</i>	Violáceas	Pensamiento	800	x	x	x						x	x	x		almácigo
<i>Zinnia elegans</i>	Compuestas	Flor de papel-Panchita	110									x	x	x	x	asiento
				0 bajo vidrio x aire libre												

Cm luego	Exigencias culturales		Epoca de floración												Colores predominantes		Observaciones
raleo/transp.	Suelo	Exposición	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
20-30	no exigente	sol-sombra	•	•	•	•	•								azul-celeste		Indicada para borduras
30-40	rico	pleno sol										•	•	•	blanco-rosa-rojo-amarillo		macizos-flor cortada
30-60	no exigente	pleno sol	•	•	•	•									follaje púrpura		macizos
30-60	no exigente	pleno sol		•	•	•									follaje rojo, verde, amarillo		macizos
20-30	rico-drenado	pleno sol										•	•	•	blanco con el centro azul		macizos-borduras
25-35	rico	pleno sol						•	•	•	•				amarillo-anaranjado		macizos-borduras-flor cortada
30-50	muy ricos	sol-media sombra	•	•	•	•									rosa-azul-lavanda		macizo-flor cortada
25-40	rico-drenado	pleno sol	•	•	•	•									rojo		macizo-borduras
20-30	rico-drenado	sol-media sombra										•	•	•	rosado-rojo-azul		macizos
20-30	rico	sol-media sombra	•	•	•	•									variados		macizos
30-40	regular	pleno sol	•	•	•	•									rosado-blanco		macizos
25-35	no exigente	pleno sol	•	•	•	•								•	amarillo con centro marrón		macizos-borduras-var. enanas
40-60	no exigente	pleno sol	•	•	•	•									blanco-rosa-rojo		macizos-pantalla últimos planos
30-40	no exigente	sol-media sombra										•	•	•	amarillo-bermejo		macizos-borduras
30-40	rico	pleno sol										•	•	•	variados		macizos-flor cortada
30-40	rico	pleno sol										•	•	•	variados		macizos-flor cortada
15-25	no exigente	pleno sol									•	•	•	•	blco-amarillo-duraz. y anar.		macizos-borduras
15-20	arenoso	pleno sol										•	•	•	amarillo-rojo		macizos-borduras-jardín de rocas
30-40	no exigente	pleno sol	•	•	•	•									follaje verde y blanco		macizos
30-40	rico	pleno sol-med. som.	•	•	•	•						•	•	•	amarillo-rojo		macizos-flor cortada
20-30	rico en humus	sol-media sombra										•	•	•	rosado		macizos
20-40	rico	pleno sol	•	•	•	•									violeta-rosado		macizos-flor cortada
20-30	no exigente	sol-media sombra										•	•	•	blanco-rosado		macizos-flor cortada
20-30	rico	pleno sol										•	•	•	blanco-amarillo-bermellón		macizos-flor cortada
20-30	no exigente	sol-media sombra										•	•	•	blanco-rosa-lila		macizos-borduras
20-30	suelta y fértil	media sombra	•	•	•	•									variados		macizos-borduras-lug. húm. y fríos
20-40	rico	sol										•	•	•	blco-amarillo-rosa-rojo-azul		para cubrir enrejados-flor cortada
15-20	rico	sol	•	•	•	•						•	•	•	blanco-amarillo-crema		flor cortada-se conserva mucho tpo.
10-15	no exigente	pleno sol										•	•	•	variados		macizos-borduras
10-15	común	pleno sol										•	•	•	rojo		macizos
10-15	no exigente	pleno sol										•	•	•	blanco-rosa-lila		borduras
25-35	no exigente	pleno sol										•	•	•	bico-crema-rosa-azul lavda.		macizos-flor cortada
15-20	común	sol										•	•	•	blanco-amarillo-anaranjado		macizos-borduras-flor cortada
20-40	suelo rico	sol-media sombra	•	•	•	•						•	•	•	blanco-rosa-lila		macizos
20-40	rico	pleno sol	•	•	•	•						•	•	•	blanco-rosa-rojo		macizos
15-20	rico	pleno sol									•	•	•	•	variados		borduras pequeñas-canteros
10-20	arenoso	pleno sol	•	•	•	•									variados		macizos-borduras-jardín de rocas
40-60	rico	sol-media sombra		•	•	•	•					•	•	•	amarillo-púrpura		macizos-flor cortada
30-40	arenoso	media sombra	•	•	•	•									rojo		perenne considerada como anual
20-40	rico	pleno sol	•	•	•	•								•	amarillo-anaranjado		macizos-borduras.
50-60	rico	pleno sol		•	•	•								•	amarillo-rojo		pantalla último plano
20-30	humífero	media sombra	•	•	•	•								•	amarillo-rojo		borduras-jardín de rocas
30-40	rico	pleno sol										•	•	•	blanco-amarillo		macizos-flor cortada
15-20	humífero	sol-media sombra	•	•	•	•						•	•	•	azul-amarillo-púrpura		macizos-borduras
20-40	humífero	pleno sol	•	•	•	•									blanco-amarillo-rosa-rojo		macizos-flor cortada