

FLORA URBANA

DEL CENTRO-OESTE DE ARGENTINA



OXALIDACEAE L.

Oxalis L.

por Eduardo Martínez Carretero y Carina Elmida

Hierbas anuales o perennes, usualmente con tubérculos, rizomas o bulbos. Tallo erecto, rastrero o ausente. Hojas radicales, 3-folioladas. Inflorescencia solitaria, cimosa o umbelada. Sépalos imbricados. Pétalos amarillos, rosados, lilas, blancos. Fruto cápsula loculicida.

- | | |
|---|--|
| 1. Con bulbos perennes, acaulescente | |
| 2. Pétalos amarillos, hojas glabras | 1. <i>O. pes-caprae</i> |
| 2'. Pétalos rosados | |
| 3. Bulbos alargados rizomatosos, foliólos obtriangulares | 2. <i>O. triangularis</i> |
| 3'. Bulbos redondeados, foliólos obcordiformes | 3. <i>O. debilis</i> var. <i>corymbosa</i> |
| 1'. Sin bulbos, tallos rastreros evidentes o rizoma rastrero muy superficial | |
| 4. Pétalos amarillos, | |
| 5. Flores solitarias o en inflorescencias 2-æ floras, estípulas soldadas en los 2/3 inferiores | 4. <i>O. corniculata</i> |
| 5'. Inflorescencia uniflora, estípulas completamente soldadas con el pecíolo, tallos largos | 5. <i>O. conhoriza</i> |
| 4'. Pétalos blancos, rosados, liliáceos, rizoma superficial >5mm espesor, foliólos obtriangulares | 6. <i>O. obtriangulata</i> |
| 4". Pétalos violáceos, foliólos obcordados | 7. <i>O. articulata</i> |

1. *Oxalis pes-caprae* L.

Sp. Pl. 1 : 434, 1753.

Herbácea perenne, acaulescente, bulbo con raíces gruesas, tallo rastrero, superficial con numerosos bulbillos. Pecíolo erecto o rastrero, de ca. 10 cm; foliólos obcordados, verde brillantes a menudo con puntos oscuros, glabros, profundamente emarginados. Inflorescencia en umbelas de 3-20 flores. Sépalos lanceolados, ápice con dos callos ocre-anaranjados. Pétalos amarillos intensos. Florece en invierno-primavera. (Martínez Carretero 5129).

2. *O. triangularis* A. St-Hil.

Fl. Bras. Merid. (cuarta ed.) 1: 102, 1825.

Herbácea, bulbosa, bulbos alargados, rizomatosos, escamosos; a veces con estolones con bulbillos secundarios. Hojas alternas, digitadas, trifolioladas, estípulas ausentes; pecíolo hasta 20 cm, cilíndrico, glabro, vináceo; peciólulo viloso; foliólos obtriangulares, conduplicados en la noche, margen entero, caras glabras vináceas. Inflorescencia

umbeliforme, flores trístílicas, brevístílicas, mesostílicas y longístílicas. Sépalos lanceolados con dos callos anaranjados. Pétalos blancos con tubo rosado con estrías lilas. Fruto cápsula glabra. Florece en primavera-verano. (Martínez Carretero 5133).

3. *O. debilis* Kunth var. *corymbosa* (DC.) Lourteig

Nov. Gen. Sp. 5: 236, ed. Col. 183, 1821 (1822).

Herbácea, bulbosa, bulbos redondeados con diversos bulbillos, estolones ausentes. Hojas digitadas, trifolioladas, estípulas ausentes; pecíolo viloso, peciólulo hirsuto; folíolos obcordiformes, conduplicados en la noche, margen ciliado, caras glabras a pubescentes con puntuaciones oscuras en la cara abaxial. Cimas umbeliformes, flores trístílicas. Sépalos libres con dos callos anaranjados en el ápice. Pétalos blancos con estrías rosáceas a liliáceas. Fruto cápsula glabra. Florece en primavera-verano. (Martínez Carretero 5134).

4. *O. corniculata* L.

Sp. Pl. ed. 1, 1: 435, 1753.

Herbácea, postrada, estolonífera. Hojas alternas o pseudo verticiladas, trifolioladas, pecíolo pubescente, peciólulos densamente pubescentes; folíolos obcordiformes, glabros a pubescentes, verdes o marrones, margen ciliado. Cimas pseudoumbeliformes, pedúnculo pubescente; flores trístílicas. Sépalos libres. Pétalos amarillos, con estrías internas anaranjadas. Fruto cápsula. Florece primavera-verano. (Martínez Carretero 5132).

5. *O. conhorrisa* Jacq.

Herbácea perenne de raíz profunda y rizomas leñosos delgados. Tallos rastreros, radicantes. Hojas alternas, trifolioladas; estípulas totalmente soldadas al pecíolo; pecíolo algo hirsuto; folíolos obcordados con hendidura profunda. Inflorescencia uniflora; pedúnculo axilar, pubescente, terminado en dos brácteas lineales opuestas. Sépalos oblongo-lanceolados. Pétalos amarillos. Fruto cápsula pubescente. Florece primavera-otoño. (Martínez Carretero 5136).

6. *O. obtriangulata* Maximowicz

Melanges Biol. Bull. Phys.-Math. Acad.

Imp. Sci. Saint Petesbourg 6: 260, 1867.

Herbácea perenne, sin tallo, rizoma rastrero, subterráneo, superficial, cubierto por escamas marrones remanentes de las bases foliares. Hojas basales; folíolos ampliamente obtriangulares, cara adaxial glabra, abaxial glabra o pubescente. Flores solitarias. Sépalos oblongos, persistentes. Pétalos blancos, oblongo-obovados de ápice emarginado. Fruto cápsula cónica. (Martínez Carretero 5096).

7. *O. articulata* Savigny

in Lamarck, Encycl. Method. 4: 686, 1797.

Herbácea perenne, acaule, con rizoma vertical-oblicuo engrosado en uno o más tubérculos leñosos. Hojas en rosetas, trifolioladas, pecíolo hirsuto; folíolos obcordados, densamente seríceo-pubescentes con manchas callosas oscuras. Escapos seríceo-pubescentes un poco más largos que las hojas. Inflorescencia en cima umbeliforme, pedicelos seríceos. Sépalos lanceolados u oblongos con 2-4 glándulas en el ápice. Pétalos violáceos. Fruto cápsula cilíndrica pubescente. (Martínez Carretero 5097).