


FICHA PARA ESTUDIANTES



Los curiosos quirquinchos que habitan en Mendoza



Foto tomando medidas de un ejemplar de piche en el campo.

Nombre científico	<i>Zaedyus pichiy</i> , <i>Chaetophractus villosus</i> , <i>Ch. vellerosus</i>
Nombre vulgar	<ul style="list-style-type: none"> Pichi, piche patagónico, quirquincho chico o armadillo de la Patagonia (<i>Zaedyus pichiy</i>). Peludo o armadillo de pelo largo (<i>Chaetophractus villosus</i>), piche llorón (<i>Chaetophractus vellerosus</i>)
Adónde habitan	<ul style="list-style-type: none"> <i>Zaedyus</i> responde a las condiciones áridas, <i>C. villosus</i> se distribuye de acuerdo a los suelos, y <i>C. vellerosus</i> de acuerdo a las precipitaciones invernales.
Cómo son	<ul style="list-style-type: none"> La cabeza y cola están cubiertas por placas y el hocico es largo y ojos pequeños. El cuerpo con escasos pelos. De orejas pequeñas y caparazón punteagudo o de bordes aserruchado. El color varía desde blanco hasta negruzco con una franja longitudinal más clara en el parte dorsal. Tamaño 1 kg (<i>Zaedyus</i>). <i>C. villosus</i> tiene pelos en la zona dorsal de color negro, orejas medianas y cola corta. Tamaño 3 kg. <i>C. vellerosus</i> tiene pelos en caparazón de color claro, con mucho pelo en vientre y dorso, cabeza estrecha, largas orejas y cola más larga que <i>villosus</i>. Peso 800g.
De qué se alimentan	<ul style="list-style-type: none"> Son omnívoros y se alimentan de invertebrados como larvas de insectos, hormigas, y escarabajos, aunque

	<p>pueden comer pequeños roedores, lagartijas, raíces, semillas y a veces huevos. <i>Zaedyus</i> es más insectívoro mientras las otras dos especies comen mas vegetación.</p>
Cómo viven	<ul style="list-style-type: none"> • Viven en madrigueras que usan como refugio las cuales excavan con sus fuertes pezuñas. Son de poca profundidad. La única entrada a la cueva la ocultan entre la vegetación y el túnel que excavan es simple sin bifurcaciones y de poca profundidad.
Cómo conviven entre ellos	<ul style="list-style-type: none"> • Son principalmente solitarios y de hábitos diurnos (<i>Zaedyus</i>) y diurnos y nocturnos las otras dos especies. • Las relaciones entre ellos se dan en época reproductiva, cuando los machos defienden su territorio y pelean por las hembras.
Otros datos interesantes	<ul style="list-style-type: none"> • Viven en suelos arenosos. Alcanzan la madurez a los nueve meses de edad, y la hembra da a luz una camada anual de una a tres crías. Entran en hibernación en los meses de invierno, y en un letargo diario superficial (torpor) durante períodos de estrés ambiental. Están amenazadas por la caza como alimento y deporte, incluida la caza con perros. Son excelentes controladores de plagas, oxigenan el suelo cuando excavan y mueven los nutrientes.



Foto: *C. villosus*



Foto: *C. vellerosus* comiendo vainas de algarrobo



Foto: ejemplar de *Z. pichyi* en su hábitat natural

Autora: Mónica Cona